

[Schengen]verklaring voor methylfenidaat en dexamfetamine

# Opiumwetmiddelen mee op reis: verklaring noodzakelijk

Geneesmiddelen zoals methylfenidaat en dexamfetamine vallen onder de Opiumwet. Om geneesmiddelen die een opiumwetmiddel bevatten legaal mee op reis te nemen, is een verklaring nodig. De benodigde verklaring en procedure zijn afhankelijk van de bestemming.

Auteur **Doerine Postma**  
Laboratorium der Nederlandse Apothekers

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor bovenstaande verklaring(en). De apotheek heeft hierbij slechts een signalerende functie, bijvoorbeeld door (de ouders van) methylfenidaatgebruikers tijdig op de vereiste papieren te attenderen. Het proces bij Farmatec kan vier weken in beslag nemen. Dit soort verklaringen moet dan ook ruim voor vertrek aangevraagd worden.

## Schengenlanden

Voor het reizen naar Schengenlanden met geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, is een Schengenverklaring nodig. De voorschrijvend arts moet deze verklaring ondertekenen. Deze dient vervolgens opgestuurd te worden naar Farmatec. Farmatec controleert de verklaring op volledigheid en echtheid en controleert de inschrijving van de arts in het BIG-register. Als alles in orde is, wordt het document gewaarmerkt, gelegaliseerd en geretourneerd.

Per verklaring mag maximaal één geneesmiddel genoteerd worden, en mogen maximaal vier verschillende reisbestemmingen genoemd worden. Een Schengenverklaring is dertig dagen geldig. Mocht de reis langer zijn, dan moeten per geneesmiddel meerdere verklaringen aangevraagd worden.

## Niet-Schengenlanden

Voor het reizen met geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen naar landen buiten het Schengengebied, is een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring moet ingevuld en ondertekend zijn door de voorschrijvend arts en dient opgestuurd te worden naar Farmatec. Net zoals bij de Schengenverklaring wordt deze verklaring door Farmatec gecontroleerd op volledigheid, echtheid en inschrijving van de arts in het BIG-register. Als alles in orde

is, wordt het document gewaarmerkt, gelegaliseerd en geretourneerd.

Als de patiënt reist naar een land dat is aangesloten bij het Apostillevrdrag moet de verklaring ook voorzien worden van een Apostillestempel [1]. Reist de patiënt naar een land dat niet is aangesloten bij het Apostillevrdrag dan moet de Engelstalige verklaring gelegaliseerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor een Engelstalige medische verklaring is er geen maximum aan het aantal geneesmiddelen dat genoteerd mag worden. Deze verklaring is maximaal één jaar geldig (vanaf de briefdatum), als er geen wijziging plaatsvindt in de medicatie en dosering.

De verklaring is vaker te gebruiken binnen dat jaar.

Ten slotte dient de patiënt (of verzorgende) contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland om te achterhalen of eventueel aanvullende documenten nodig zijn.

## Rol apotheek

De apotheek kan helpen met het verstrekken van een medicijnpaspoort als ondersteuning bij de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring, maar het paspoort vervangt de verklaring niet. Verder kan de patiënt geadviseerd worden om geneesmiddelen in de originele verpakking van de apotheek mee te nemen op vakantie. Lever, indien geen originele verpakking van de fabrikant wordt verstrekt, bij elke verpakking een bijsluiter. ■

Alle informatie, inclusief voorbeelden van de verklaringen en een uitvoerige informatiefolder, is te vinden op site van Farmatec [2].

Zie voor de literatuurreferenties de digitale versie van dit artikel op pw.nl.

Een poster over de Schengenverklaring op reis is op te vragen via [www.knmp.nl](http://www.knmp.nl)

- 1 <http://www.kennisbank.knmp.nl>, geraadpleegd 07-04-2014.
- 2 Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12<sup>th</sup> edition.
- 3 Lantz MS, Buchalter EN, Giambanco V. Serotonin syndrome following the administration of tramadol with paroxetine. *Int J Ger Psychiatry* 1998;13:343-5.
- 4 Egberts AC, ter Borgh J, Brodie-Meijer CC. Serotonin syndrome attributed to tramadol ADDITION to paroxetine therapy. *Int Clin Psychopharmacol* 1997;12:181-2.
- 5 Mittino D, Mula M, Monaco F. Serotonin syndrome associated with tramadol-sertraline coadministration. *Clin Neuropharmacol* 2004;27:150-1.
- 6 Laugesen S, Enggaard TP, Pedersen RS, Sindrup SH, Brøsen K. Paroxetine, a cytochrome P450 2D6 inhibitor, diminishes the stereoselective O-demethylation and reduces the hypoalgesic effect of tramadol. *Clin Pharmacol Ther* 2005;77:312-23.