

Gynaecologen schrijven vooral ovulatiestimulerende geneesmiddelen voor

Receptenaandeel IVF hoog

Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 600.000 keer een door gynaecologen voorgeschreven geneesmiddel. 55% van de uitgaven hieraan gingen naar ovulatiestimulerende middelen, waaronder die voor IVF.

Van de ruim 28 miljoen in 2013 door specialisten voorgeschreven geneesmiddelen komt 2,1% uit de pen – of computer – van een gynaecoloog. De totale uitgaven aan door specialisten voorgeschreven geneesmiddelen kwamen vorig jaar uit op € 1,4 miljard. 2,5% hiervan komt op het conto van de gynaecologen. De gemiddelde uitgaven per voorschrift van gynaecologen zijn met € 57 iets hoger dan de € 49 voor een gemiddeld specialistenrecept.

Geslachtshormonen

Gynaecologen schrijven vooral middelen voor om de vruchtbaarheid te beïnvloeden of bij de overgang. 43% van de door gynaecologen voorgeschreven geneesmiddelen behoort tot de groep geslachtshormonen en modulators van het genitale stelsel (ATC2-code G03). In het overzicht op ATC3-niveau van wat de gynaecologen het meest voorschrijven, behoren de bovenste vier alle tot die G03-groep (zie tabel). Het overzicht wordt aangevoerd door de ovulatiestimulerende middelen (ATC3-code G03G) die onder meer ingezet worden bij in-vitrofertilisatie (IVF). Ze worden ook vrijwel uitsluitend door gynaecologen voorgeschreven. De uitgaven aan deze middelen maken meer dan de helft – 55% – uit van de geneesmiddeluitgaven van de gynaecologenreceptuur. Dat aandeel zal naar verwachting in 2014 drastisch dalen, aangezien de geneesmid-

delen die bij IVF worden toegepast met ingang van 1 januari 2014 zijn overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Tweede in het overzicht staan de hormonale anticonceptiva (G03A). Hoewel het aantal voorschriften van deze middelen 9% uitmaakt van de gynaecologenreceptuur, vormt dat aantal slechts 1,6% van het totale aantal verstrekkingen van deze anticonceptiva.

Meer dan gemiddeld

Op de vijfde plaats van de meest door gynaecologen voorgeschreven geneesmiddelgroepen staan de ijzerpreparaten. Ze worden naar verhouding tien keer vaker dan gemiddeld door gynaecologen voorgeschreven.

Ze dienen voor ondersteuning bij bloedarmoede, die onder meer bij zwangerschap vaker voorkomt. Binnen de ATC3-groep L02A schrijven gynaecologen vooral triptoreline en leuproreline voor. Deze middelen worden onder andere toegepast bij endometriose. Middelen uit deze groep worden niet alleen veel door gynaecologen voorgeschreven, maar ook door urologen voor prostaatacarcinoom bij mannen. Andere geneesmiddelgroepen die gynaecologen vaak voorschrijven zoals pijnstillers, maagzuurremmers en laxeremiddelen, hebben een toepassing van meer algemene aard. Gynaecologen schrijven deze middelen gemiddeld net zo vaak voor als andere artsen. ■

Merendeel uitgaven voor ovulatiestimulerende middelen, dit jaar voor het laatst

geneesmiddelgroep	atc3	toepassing	voorbeeld uit groep	aandeel receptuur	aandeel uitgaven
1 ovulatiestimulerende middelen	G03G	verminderde vruchtbaarheid	follitropine	19%	55%
2 hormonale anti-conceptiva	G03A	zwangerschapspreventie	levonorgestrel / ethinylestradiol	9%	3%
3 oestrogenen	G03C	o.a. overgangsklachten	estriol	8%	3%
4 progestagenen	G03D	vruchtbaarheid regulatie	progesteron	7%	2%
5 ijzerpreparaten	B03A	bloedarmoede	ferrofumaraat	5%	1%
6 NSAID's	M01A	bij pijn	diclofenac	4%	1%
7 laxantia	A06A	bevordering darmlediging	macrogol-combinaties	4%	1%
8 hormonen	L02A	o.a. bij endometriose	triptoreline	4%	12%
9 enkelvoudige corticosteroiden	D07A	eczeemachtige aandoeningen	clobetasol	3%	1%
10 maagzuurremmers	A02B	remming maagzuur	omeprazol	2%	1%